



**Bilan du suivi des oiseaux
2018-2020**



L'Europe s'engage
en Bretagne

Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural :
l'Europe investit dans les zones rurales



**Côtes d'Armor
le Département**



FC	CS27 : Suivi des oiseaux hivernants ou en halte migratoire						Priorité
1							2
Planification prévisionnelle							
Année d'intervention	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Temps gestionnaire	8 jours par an						

FC	CS26 : Suivi et inventaire des oiseaux nicheurs						Priorité
1							2
Planification prévisionnelle							
Année d'intervention	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	C1 / C3	C2 / C3	C1/ C2	C1 / C3	C2 / C3	C1 / C2	C2 / C3
Temps gestionnaire	2 jours par an						

Contexte

La réserve accueille une forte diversité d'oiseaux, avec 179 espèces connues sur le site dont 36 ont une valeur patrimoniale (cf : *Plan de gestion 2018-2014 : réserve naturelle régionale des "Landes, prairies et étangs de Plounerin"*). Parmi ces espèces, 11 ont un statut nicheur et 16 «d'oiseaux d'eau» hivernants ou de passage. L'Étang du Moulin Neuf est considéré comme un site d'intérêt départemental pour l'hivernage ; il fait l'objet de suivi naturaliste depuis de nombreuses années.

L'apport de connaissance sur ce groupe a principalement eu lieu sur la zone de l'Étang du Moulin Neuf, avec une pression d'observation très forte entre 1980 et 2010 par Jacques Maout. Les autres secteurs de la réserve ont été beaucoup moins prospectés.

Liste des oiseaux reconnus d'intérêt patrimonial sur la réserve :

Nom vernaculaire	Statut sur le site (N si nicheur – (N) si anciennement nicheur)	Protection UE/SPEC	LR N/R (si NT ou plus)	Responsabilité régionale (de élevée à majeure)	Habitat(s) associé(s)	Présence sur la réserve	Classe
Fauvette pitchou	N	D.O /SPEC 2		Très élevée	Landes à ajoncs	A été contactée il y a quelques années sur le secteur de l'Étang du Moulin Neuf. Les prospections ciblées du printemps et de l'été 2014 et 2016 n'ont pas permis de confirmer cette donnée	B
Râle d'eau	N		- /EN (N)	élevée	Plans d'eau peu profonds, saulaies...	Son cri caractéristique a été entendu à plusieurs reprises sur l'Étang du Moulin Neuf et Prat Trovern	B
Pipit farlouse	N		VU(N)/ VU(N)	élevée	Landes basses, prairies humides	Nicheur signalé autour de l'Étang du Moulin Neuf, sa présence est à surveiller car elle reste parmi les derniers sites non littoraux des Côtes d'Armor	B
Gobemouche gris	N	SPEC 3	- /VU (N)		Bocage, jardins, clairières...	Connu sur le site	B
Grosbec casse-noyaux	N		/VU (N)	Modérée	Forêts feuillues, parcs	Connu sur le site	B
Bouvreuil pivoine	N		VU(N)/V U(N)	élevée	Milieux boisés et bocager	Connu sur le site	B

Bruant des roseaux	N		/VU (N)	Modérée	Prairies humides, roselières	Connu sur le site	B
Hirondelle de rivage	N	SPEC 3			Falaises, carrières	Nicheuse à proximité du site du Moulin Neuf	C
Locustelle tachetée	(N)				Landes, prairies humides...	Le statut de l'espèce est très difficile à établir, du fait notamment de sa discrétion. Si elle est contactée largement sur le territoire, aucun indice de nidification certain n'a ainsi été établi sur les Côtes-d'Armor sur la période 2004-2012.	C
Grèbe castagneux	N				Petits plans d'eau végétalisés	Nicheur à l'Étang du Moulin Neuf et à l'Étang de Prat Trovern	C
Grèbe huppé	N				Plans d'eau	Connu sur le site	C
Canard pilet		SPEC 3	-/VU (H)	élevée	Plans d'eau	Petites populations sur l'Étang du Moulin Neuf et Prat Trovern en hiver	C
Canard souchet		SPEC 3			Plans d'eau	Petites populations sur l'Étang du Moulin Neuf et Prat Trovern en hiver	C
Sarcelle d'été		SPEC 3			Plans d'eau	Petites populations sur l'Étang du Moulin Neuf et Prat Trovern	C
Canard chipeau		SPEC 3			Plans d'eau	Petites populations sur l'Étang du Moulin Neuf et Prat Trovern en hiver	C
Fuligule milouin		SPEC 2	/EN (H)	élevée	Plans d'eau	Petites populations sur l'Étang du Moulin Neuf en hiver	C
Fuligule morillon		SPEC 3W			Plans d'eau	Petites populations sur l'Étang du Moulin Neuf et Prat Trovern en hiver	C
Fuligule milouinan		SPEC 3W	/EN (H)	majeure	Plans d'eau	Petites populations sur l'Étang du Moulin Neuf en hiver	C
Grande Aigrette			-/EN	élevée	Plans d'eau, vasières	Passages annuelles sur l'Étang du Moulin Neuf	C
Héron pourpré		SPEC 3			Plans d'eau, roselières	Passages annuelles sur l'Étang du Moulin Neuf	C
Butor étoilé		SPEC 3			Plans d'eau, roselières	Hivernant presque tous les ans	C
Chevalier sylvain		SPEC 3			Plans d'eau, vasières	1 à 2 hivernants sont observés selon les années autour de l'Étang du Moulin Neuf	C
Guifette noire		SPEC 3	VU (N)		Plans d'eau	Passage hivernal régulier	C
Bécassine sourde		SPEC 3			Prairies humides hautes, vasières	De passage sur l'Étang du Moulin Neuf	C
Grèbe à cou noir					Plans d'eau	Passage très occasionnel sur l'Étang du Moulin Neuf	C
Autour des palombes					Massifs boisés	A été découvert récemment, en 2014. Une femelle a ainsi été observée longuement, et à plusieurs reprises, en vol au-dessus de Lann Droën, en période de nidification (V. Troadec, comm. pers.). La nidification en Forêt de Beffou à proximité, est connue.	C
Busard des roseaux					Roselières	Utilise régulièrement l'Étang du Moulin Neuf.	C
Busard Saint-Martin		SPEC 3			Landes, cultures, prairies...	Utilise l'Étang du Moulin Neuf - Occasionnellement	C

Busard cendré					Landes, cultures, prairies...	Utilise l'Etang du Moulin Neuf - Occasionnellement	C
Faucon émerillon					Landes basses, cultures...	Chasse sur la réserve occasionnellement	C
Faucon pèlerin					Falaises, carrières	Chasse sur la réserve occasionnellement	C
Faucon hobereau					Bosquets à proximité de zones humides	Chasse sur la réserve occasionnellement	C
Bondrée apivore					Terrains découverts, proximité de vieilles futaies clairsemées	A été vu plusieurs fois sur la réserve	C
Pipit spioncelle					Bords d'étangs, prairies humides	Observé sur le site	C

Le plan de gestion prévoit différentes opérations pour le suivi des oiseaux :

- Le suivi des oiseaux d'eau,
- Le suivi des oiseaux nicheurs.

A ces deux suivis « standardisés », les données sont complétées par les observations aléatoires et ponctuelles des agents de Lannion-Trégor Communauté (LTC) et par la synthèse des observations transmises au site « Faune-Bretagne ».

Matériel et méthode

Suivi des oiseaux d'eau

Ce comptage consiste en un suivi des oiseaux présents sur les différentes pièces d'eau de la réserve. Il est réalisé toute l'année, avec une fréquence variable suivant les mois, pour mieux suivre les migrations. Tous les oiseaux sur le plan d'eau sont identifiés et dénombrés.

Trois points de suivi fixes sont prévus à l'Etang du Moulin Neuf : à l'observatoire, sur la digue et sur le ponton rive gauche.

Deux fréquences de comptage ont été choisies :

- 1 fois par mois toute l'année,
- tous les 15 jours lors des périodes de migrations (aux environs d'octobre/novembre et de février/mars).

La participation aux opérations de bagage menées par l'ONCFS sur le site permet de suivre l'évolution des effectifs des Bécassines des marais et sourde.

Suivi des oiseaux nicheurs

Le protocole choisi est de type « indice ponctuel d'abondance », basé sur le protocole STOC-EPS. Des points d'écoute de 10 minutes sont réalisés à des endroits précis qui restent inchangés. En 2017, une sortie de terrain a permis de définir et de réaliser les premiers points d'écoute. 2 circuits de 6 points écoutes ont été mis en place. En 2018, un troisième circuit a été défini sur l'Etang du Moulin Neuf.




Figure 1 : Carte des points d'écoutes du suivi des oiseaux nicheurs

Sur chaque point d'écoute, les espèces observées ou entendues sont notées sur la fiche terrain (cf. annexe 1). La distance de contact (<25m, 25-100m et >100m) est précisée. Il sera précisé si l'oiseau a été contacté en vol. L'heure de début de chaque point d'écoute est notée, ainsi que la météo (vent faible/fort, ensoleillé/nuageux etc...) selon les critères du protocole STOC EPS dans le tableau suivant :

Couverture nuageuse	Pluie	Vent	Visibilité
0 – 33 % = 1	Absente =1	Absent =1	Bonne = 1
33 % - 66% = 2	Bruine = 2	Faible = 2	Modérée = 2
66% - 100% =3	Averses = 3	Moyen à fort = 3	Faible = 3

Deux passages sont réalisés pour chaque point d'écoute ; un premier début mai et le second début juin. La prospection est réalisée le matin, au lever du jour.

Pour chaque point d'écoute, l'habitat principal et secondaire sera défini à partir du code habitat du protocole STOC-EPS.

Tous les points d'écoute des 3 circuits ne pouvant être réalisés une même année, un système de rotation a été mis en place. Chaque circuit sera réalisé 2 années sur 3, comme indiqué dans la planification prévisionnelle.

Lors des prospections, une attention particulière sera portée sur les rapaces diurnes ; leur comportement sera précisé lors des relevés. La Fauvette Pitchou est également une espèce pour laquelle la meilleure connaissance des zones de cantonnement est importante.

Baguage de Bécassine ONCF

L'ONCF (OFB) mène depuis 2006 des campagnes de baguage sur le site de l'Étang du Moulin Neuf. Deux à trois fois par an, des filets sont tendus sur les rives de l'étang (généralement parcelle 12 ou 5). Les journées froids d'hiver sont recherchées pour mettre en place ce dispositif.

Une dizaine de bécassines (des marais et sourdes) sont capturés et bagués tous les ans.

Le technicien de l'OFB associe la collectivité aux baguages et envoie en fin d'année le bilan de son dispositif.


Résultats 2018

Les oiseaux d'eau ou des milieux associés

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Canard chipeau											4	
Canard colvert	6	3	3	7	17	10	4	23	69	75	30	8
Canard souchet	-	-	9	-							4	2
Sarcelle d'hiver	-	-	-	4						27	12	
Grèbe huppé	-	-	-	-	1						1	2
Fuligule morillon									1	1		
Grande aigrette						1						
Foulque macroule	6	2	5	3	2	4	4	7	25	28	12	10
Gallinule poule-d'eau	-	-	1	3			1	3	3	3		
Martin pêcheur											1	
Mouette rieuse	65	19					41	68		253	110	30
Bécassine des marais	1	-							5			
Goéland argenté	-	1	1	6			1			4		
Goéland brun	-	-	2	2				5				
Grand Cormoran	-	-	1					1	2	5	9	2
Héron cendré	-	-	1	1		1	1	2	3		2	2
Chevalier guignette	-	-	-	-	1				1	1		
Chevalier aboyeur							4					
Chevalier culblanc										3		
Vanneau huppé							1		5		42	

Sur les 20 espèces d'oiseau d'eau ou de berges identifiés, la présence du **Canard Chipeau**, du **Canard souchet**, du **Fuligule Morillon** et de la **Grande Aigrette** présente un intérêt modéré mais plus fort que les autres espèces.

Pour l'anecdote, trois Cigognes noires ont été vues de passage sur l'Etang au cours de l'automne.



Les oiseaux nicheurs identifiés lors des suivis dédiés

51 espèces différentes d'oiseaux « nicheur probable » ont été identifiées lors des deux passages sur les parcours C1 et C3.

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant zizi
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Chouette hulotte
Corneille noire
Faisan de Colchide
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Foulque macroule

Gallinule poule-d'eau
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique,
Hirondelle de cheminée
Locustelle tachetée
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue,
Orite à longue queue
Mésange bleue

Mésange charbonnière
Mésange huppée
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon

La présence de la **Locustelle tachetée**, du **Bruant des roseaux** et du **Bouvreuil Pivoine** en « nicheur probable » est à relever.

Ensembles des données de « avifaune » enregistrées sur la réserve en 2018 :

Accenteur mouchet	Fuligule morillon	Mouette rieuse
Alouette des champs	Gallinule poule-d'eau	Petit gravelot
Bécassine des marais	Geai des chênes	Pic épeiche
Bécassine sourde	Gobemouches gris	Pic épeichette
Bergeronnette des ruisseaux	Goéland argenté	Pic noir
Bergeronnette grise	Goéland brun	Pic vert, Pivert
Bergeronnette printanière	Goéland cendré	Pie bavarde
Bouvreuil pivoine	Goéland leucopnée	Pigeon ramier
Bruant des roseaux	Grand Cormoran	Pinson des arbres
Bruant jaune	Grande Aigrette	Pipit des arbres
Bruant zizi	Grand gravelot	Pipit farlouse
Buse variable	Grèbe castagneux	Pipit sponcielle
Canard chipeau	Grèbe huppé	Pouillot fitis
Canard colvert	Grimpereau des jardins	Pouillot véloce
Canard souchet	Grive draine	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau
Chardonneret élégant	Grive littorne	Rale d'eau
Chevalier aboyeur	Grive musicienne	Roitelet huppé
Chevalier culblanc	Héron cendré	Roitelet à triple bandeau
Chevalier guignette	Hirondelle de fenêtre	Rougegorge familier
Choucas des tours	Hirondelle de rivage	Sarcelle d'hiver
Chouette hulotte	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	Sittelle torchepot
Cigogne noire	Linotte mélodieuse	Tadorne de belon
Cisticole des joncs	Locustelle tachetée	Tadorne casarca
Corneille noire	Martin pêcheur	Tarier des prés
Faisan de Colchide	Martinet noir	Tarier pâtre
Faucon hobereau	Merle noir	Tarin des aulnes
Fauvette à tête noire	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	Tourterelle turque
Fauvette des jardins	Mésange bleue	Troglodyte mignon
Foulque macroule	Mésange charbonnière	Vanneau huppé
	Mésange huppée	Verdier d'europe
	Mésange nonnette	

Observation sur Faune-bretagne et par les agents de LTC

Observation uniquement sur Faune-bretagne

Observation uniquement par les agents de Lannion-Trégor Communauté

A noter quelques espèces dont la présence 2018 est connue grâce aux bénévoles transmettant leurs données sur le site www.faune-bretagne.

La présence de la Tadorne de Casarca fait partie des surprises annuelles « divertissantes ».

Bilan 2018

89 espèces d'oiseaux ont été observées sur la réserve en 2018.

Certaines présentent une valeur patrimoniale reconnue pour le site :

Hivernant ou de passage - intérêt local (C)
Bécassine sourde
Canard chipeau
Canard souchet
Faucon hobereau
Fuligule morillon
Grande Aigrette
Pipit spioncelle
Locustelle tachetée

Nicheur : intérêt régional (B)
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Nicheur : intérêt local (C)
Hirondelle de rivage

Les suivis ont été réalisés mais c'est le premier passage pour certains d'entre eux. Il est donc encore trop tôt pour tenter d'analyser des tendances.

Résultats 2019

Les oiseaux d'eau ou des milieux associés

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Canard chipeau		2										
Canard colvert	4	9	11	9	8	24	48	37	82	38	12	25
Canard mandarin				1								
Canard souchet			3									
Chevalier culblanc						1						
Chevalier gambette							1					
Chevalier guignette							1	1				
Foulque macroule	10	11	6	6			2	15		26	1	5
Fuligule morillon										1		
Gallinule poule-d'eau				2								
Goéland argenté										1	1	
Goéland brun							3					
Goéland leucophée							6					
Grand Cormoran			2					1		7	3	4
Grande aigrette								1				
Grèbe castagneux										2	1	
Grèbe huppé	2	2	2	1	1							
Héron cendré	1					1	2	1	1	2	1	
Martin pêcheur										1		
Mouette rieuse	100					1	125			17	159	20
Sarcelle d'hiver	4	1							1	11		

Sur les 21 espèces d'oiseau d'eau ou de berges identifiés, la présence du **Canard Chipeau**, du **Canard souchet**, du **Fuligule Morillon** et de la **Grande Aigrette** présente un intérêt modéré mais plus fort que les autres espèces.

Le nombre d'espèces et d'individus est peu différents des données 2018.

Les oiseaux nicheurs identifiés lors des suivis dédiés

40 espèces différentes d'oiseaux « nicheur probable » ont été identifiées lors des deux passages sur les parcours C2 (Liden, Poul Ar Fank, Plouénrin Gare) et C3 (Etang du Moulin Neuf) sur les 426 contacts d'individus relevés.

9 espèces vues en 2017 ou 2018 non pas revues en 2019 (Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant zizi, Chardonneret élégant, Chouette Hulotte, Hirondelle des fenêtres, Locustelle tachetée, Mésange nonnette, Pic épeichette)

Accenteur mouchet

Bergeronnette grise

Bouvreuil pivoine

Bruant des roseaux

Bruant jaune

Buse Variable

Choucas des tours

Corneille noire

Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Fauvette des jardins

Geai des chênes

Grimpereau des jardins

Grive draine

Grive musicienne

Hirondelle des rivages

Hirondelle rustique

Linotte mélodieuse

Merle noir

Martinet noir

Mésange à longue queue

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Mésange huppée

Moineau domestique

Pic épeiche

Pic noir

Pie bavarde

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pipit des arbres

Pipit farlouse

Pouillot fitis

Pouillot véloce

Roitelet huppé

Roitelet triple bandeau

Rougegorge familier

Sitelle torchepot

Tourterelle turque

Troglodyte mignon

En bleue : les espèces identifiées comme nicheur probable pour la première fois en 2019

En vert : les espèces identifiées comme nicheur probable pour la première fois en 2018

La présence du **Pipit Farlouse**, **Pouillot fitis**, du **Bruant des roseaux** et du **Bouvreuil Pivoine** en « nicheur probable » est à relever.

Baguage de Bécassine OFB

L'OFB est intervenue 3 fois en 2019 :

29 janvier 2019 : 32 bécassines des marais capturées dont 9 contrôles (1 de 2014, 3 de 2017, 4 de 2018, le 9^{ème} oiseau a été bagué le 8 septembre 2017 à Costaros en Haute Loire).

7 mars 2019 : 33 bécassines capturées dont 3 sourdes (avec 6 contrôles, 3 de 2018, 2 de 2019 + 1 sourde de 2018 dont c'est le deuxième contrôle (oiseau fidèle à son site d'hivernage).

30 octobre 2019 : 7 bécassines capturées dont 3 sourdes (l'oiseau bagué le 8 septembre 2017 en Haute Loire a fait l'objet d'un second contrôle)

Ensemble des données de « avifaune » enregistrées sur la réserve en 2019 :

Accenteur mouchet	Faucon crécerelle	Mésange bleue
Becs-croisés des sapins	Faucon hobereau	Mésange charbonnière
Bécassine des marais	Fauvette à tête noire	Mésange huppée
Bécassine sourde	Fauvette des jardins	Mésange nonnette
Bergeronnette grise	Foulque macroule	Moineau domestique
Bergeronnette des ruisseaux	Fuligule morillon	Mouette rieuse
Bondrée apivore	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau	Pic épeiche
Bouvreuil pivoine	Geai des chênes	Pic épeichette
Bouscarle de Cetti	Goéland argenté	Pic noir
Bruant des roseaux	Goéland brun	Pie bavarde
Bruant jaune	Goéland leucopnée	Pigeon ramier
Busard des roseaux	Grand Cormoran	Pinson des arbres
Buse variable	Grande Aigrette	Pipit des arbres
Canard chipeau	Grèbe castagneux	Pipit farlouse
Canard colvert	Grèbe huppé	Pipit Sponcielle
Canard colvert	Grimpereau des jardins	Pouillot fitis
Canard mandarin	Grive draine	Pouillot véloce
Canard souchet	Grive littorne	Roitelet à triple bandeau
Chardonneret élégant	Grive musicienne	Roitelet huppé
Chevalier aboyeur	Héron cendré	Rougegorge familier
Chevalier culblanc	Hirondelle de fenêtre	Sarcelle d'hiver
Chevalier gambette	Hirondelle de rivage	Sarcelle d'été
Chevalier guignette	Hirondelle rustique	Sittelle torchepot
Choucas des tours	Linotte mélodieuse	Tarier pâtre
Cisticole des joncs	Macreuse noire	Tarin des aulnes
Corneille noire	Martin-pêcheur d'Europe	Tourterelle turque
Coucou gris	Martinet noir	Touterelle des bois
Epervier d'Europe	Merle noir	Troglodyte mignon
Étourneau sansonnet	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	Moineau huppé
Faisan de Colchide		Verdier d'Europe

En bleu : les données issues du site d'observation naturaliste faune-bretagne

En gras : les statuts présentant un statut de rareté

Bilan 2019

89 espèces d'oiseaux ont été observées sur la réserve en 2019.

Certaines présentent une valeur patrimoniale reconnue pour le site :

Hivernant ou de passage - intérêt local (C)
Bécassine sourde
Bondrée apivore
Busard des roseaux
Canard chipeau
Canard souchet
Faucon hobereau
Fuligule morillon
Grande Aigrette
Pipit spioncelle
Grèbe castagneux
Grèbe huppée
Locustelle tachetée

Nicheur : intérêt régional (B)
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Pipit farlouse
Pouillot fitis
Nicheur : intérêt local (C)
Hirondelle de rivage

Le cortège des oiseaux observées reste relativement important et stable par rapport à 2018.

Aucune observation notable n'est à noter en particulier sur cette année.

Résultats 2020

Les oiseaux d'eau ou des milieux associés

	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Aigrette garzette							1	1		1		
Canard colvert	6	1	6	5	34	7	7	21	56	81	6	8
Canard souchet	5											
Chevalier guignette								1	1	1	16	5
Foulque macroule	13	1		2					9	14		
Gallinule poule-d'eau	1		4	1	1							
Goéland argenté	3	1										
Goéland brun								3				
Grand Cormoran	5		1					1	4	11	3	1
Grande aigrette	1						1	1		2		
Grèbe castagneux									1			
Grèbe huppé	1		2									
Héron cendré	1				1	2	1	1	1	3		
Mouette rieuse	57	1					5	33	24	13	34	36
Sarcelle d'hiver									36	24	4	

Sur les 15 espèces d'oiseau d'eau ou de berges identifiés, la présence de **la Grande Aigrette** présente un intérêt modéré.

Le nombre d'espèces et d'individus identifiés est un peu plus faible que les années précédentes.

Les oiseaux nicheurs identifiés lors des suivis « nicheurs »

44 espèces différentes d'oiseaux « nicheur probable » ont été identifiées lors des deux passages sur les parcours C1 (Prat Trovern, Pen Ar Wern) et C2 (Liden, Poul Ar Fank, Plounérin Gare) sur les 311 contacts d'individus relevés.

Accenteur mouchet	Foulque macroule	Mésange nonnette
Alouette des champs	Gallinule poule d'eau	Pic épeiche
Bondrée apivore	Geai des chênes	Pic noir
Bouvreuil pivoine	Goéland argenté	Pigeon ramier
Bruant des roseaux	Grimpereau des jardins	Pinson des arbres
Bruant jaune	Grive draine	Pipit des arbres
Bruant zizi	Grive musicienne	Pouillot fitis
Buse variable	Hirondelle de fenêtre	Pouillot véloce
Canard colvert	Hirondelle rustique	Roitelet huppé
Choucas des tours	Martinet noir	Roitelet triple bandeau
Corneille noire	Merle noir	Rouge gorge familier
Coucou gris	Mésange à longue queue	Sittelle torchepot
Faisan de de Colchide	Mésange bleue	Tourterelle des bois
Fauvette à tête noire	Mésange charbonnière	Troglodyte mignon
Fauvette des jardins	Mésange huppée	

La présence de **la Bondrée apivore, de la Tourterelle des bois, de la Mésange nonnette, du Pouillot fifis, du Bruant des roseaux et du Bouvreuil Pivoine** en « nicheur probable » est à relever.

Baguage de Bécassine OFB

L'OFB est intervenue 3 fois en 2020, le 17 janvier, le 10 mars et le 05 novembre.

Le bilan interannuel est le suivant :

ANNEE	2014	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
OISEAUX CAPTURES	8 (3)	6 (5)	29 (12)	46 (11)	72 (7)	83 (6)	244
OISEAUX BAGUES	8 (3)	6 (5)	27 (11)	40 (7)	57 (6)	60 (5)	198
OISEAUX CONTROLES	3 (1)	_	7 (3)	14 (5)	24 (1)	30 (1)	78

() entre parenthèses, les bécassines sourdes.

Total des espèces observées :

Ensemble des données de « avifaune » enregistrées sur la réserve en 2020, cette liste de 84 espèces différentes intègre les données issues des prospections ciblées et de la base des observations réalisées par des bénévoles et issus du site Faune Bretagne :

Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Alouette des champs
Bécasse des bois
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bondrée apivore (N)
Bouvreuil pivoine (N)
Bruant des roseaux (N)
Bruant jaune
Bruant zizi
Buse variable
Canard colvert
Canard souchet
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Choucas des tours
Chouette effraie
Chouette hulotte
Cisticole des joncs

Cormoran huppé
Corneille noire
Coucou gris
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Foulque macroule
Gallinule poule-d'eau
Geai des chênes
Gobemouche gris
Goéland argenté
Goéland brun
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Héron cendré

Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue,
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette (N)
Moineau domestique
Mouette rieuse
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset

Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du nord, Pinson des Ardennes
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit spioncelle
Pouillot fitis (N)
Pouillot véloce
Poule-d'eau
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Sarcelle d'été
Sarcelle d'hiver
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Tourterelle des bois (N)
Tourterelle turque

Annexes

N° du point :	1er ou 2e passage :	date :	Heure début :	Observateur(s) :		
Couverture nuageuse	Pluie	Vent	Visibilité			
0 - 33% = 1	Absente = 1	Absent = 1	Bonne = 1			
33% - 66% = 2	Bruine = 2	Faible = 2	Modérée = 2			
66% - 100% = 3	Averses = 3	Moyen à fort = 3	Faible = 3			
	1	2	3		4	
Habitat principal :						
Habitat secondaire :						
Espèce	Distance de contact			Vol	Remarques (comportement ...)	Total
	< 25m	25-100m	> 100 m			

